

# Optimale Ultraschalldiagnostik

## Terminkalender

Vorgeburtliche Untersuchungsmethode	Zeitraum	Bedeutung
Vaginaler Früh-Ultraschall	6. – 8. SSW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminbestimmung</li> <li>• Nachweis von kindlichen Herzaktionen</li> <li>• Mehrlings-Diagnose: Beurteilung Amnion/Chorion</li> <li>• Ausschluss einer Eileiterschwangerschaft</li> </ul>
Chorionzottenbiopsie	ab 11 + 0 SSW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• früher Ausschluss von Chromosomenstörungen (invasiv)</li> </ul>
Nacken-Transparenz-Untersuchung Erst-Trimester-Screening	möglich: ab 11 + 0 – 13 + 6 SSW optimal: ab 12 + 0 – 13 + 0 SSW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wachstumskontrolle</li> <li>• Kontrolle früher Hinweiszeichen auf Chromosomenstörungen</li> <li>• Ausschluss von Fehlbildungen</li> </ul>
Amniozentese	ab 14 + 0 SSW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschluss von Chromosomenstörungen (invasiv)</li> </ul>
Triple-Test	14 + 0 – 17 + 6 SSW optimal: 15 + 3 SSW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risikoabschätzung für kindliche Chromosomenstörungen durch mütterliche Blutuntersuchungschwangerschaft</li> </ul>
Nabelschnurpunktion	ab 18 + 0 SSW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infektionsdiagnostik</li> <li>• Ermittlung des kindlichen Blutfarbstoffes</li> <li>• Ausschluss von Chromosomenstörungen</li> </ul>
Zweites-Trimester-Screening (Organscreening)	ab 19 + 0 SSW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wachstumskontrolle</li> <li>• Fehlbildungsausschluss</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fetale Echokardiographie</li> <li>• evtl. Zervixmessung</li> <li>• evtl. Dopplerscreening</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fetale Herzuntersuchung</li> <li>• Doppler- und Farbdoppler-untersuchung zum Ausschluss von Wachstumsstörungen</li> </ul>
Dopplersonographie	ab 23 + 0 SSW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschluss einer Plazentainsuffizienz</li> <li>• Nachweis einer frühen Retardierung</li> <li>• Ausschluss früher Wachstumsstörungen sowie Verlaufskontrolle funktioneller Fehlbildungen</li> </ul>
3-D Ultraschall	24. – 28. SSW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• optionale Oberflächendarstellung des Kindes</li> </ul>
Drittes-Trimester-Screening • Dopplersonographie	ab 29 + 0 SSW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plazentabeurteilung</li> <li>• Fruchtwasserbeurteilung</li> <li>• Ausschluss von Fehlbildungen</li> <li>• Ausschluss später Wachstumsstörungen</li> <li>• Durchblutungsmessung</li> </ul>
Lagekontrolle		